

DIC Thrombosen



Beschreibung:

Bei großen Thrombosen (ausgedehnte Becken-Beinvenenthrombose, Splanchnikusthrombosen, große Pulmonalembolie) kann es im Rahmen der Gerinnungsaktivierung auch zum Verbrauch der Thrombozyten kommen. Auch andere Gerinnungsfaktoren (z.B. Fibrinogen) und Inhibitoren können verbraucht werden. Das Bild kann ähnlich wie bei DIC sein (siehe dort).

Diagnostik:

Repetitive Bestimmungen von Blutbild, Gerinnung (PTZ, APTT, Fibrinogen, D-Dimer und Antithrombin) Bildgebung (Sonografie, Angiografie, Computertomografie, Magnetresonanztomografie)

Therapie:

Therapeutische Antikoagulation (auch bei niedrigen Thrombozytenzahlen)
Eventuell Antithrombin-Substitution

Referenzen:

Thomas L, Labor und Diagnose, 2023, Release 5: <https://www.labor-und-diagnose.de/index.html>

Parameterkatalog des Klinischen Instituts für Labormedizin, Med.Univ.Wien und AKH Wien:

<https://www.akhwien.at/default.aspx?pid=3982>

Leistungsverzeichnis der Klinischen Chemie, Univ.Klinikum Ulm: <https://www.uniklinik-ulm.de/zentrale-einrichtung-klinische-chemie/leistungsverzeichnis.html>